飼料作物栽培と作付体系

作物名	品種名	利用目的	品種の特性	播種		施肥量（10a）		雑草対策等	刈取時期	作付け体系　○：播種　×：収穫
				期間	播種量（10a）	元肥	追肥 BBNKC3			1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
トウモロコシ	ﾊﾟｲｵﾆｱ115日（セシリア）	ｻｲﾚｰｼﾞ	早生。TDN収量に優れる。	3月下旬～5月中旬	点播 畦間75cm 株間20cm 2～3kg	飼料作物838号 120kg/10a 堆肥 2t/10a	5～6葉期 30kg	（ﾄｳﾓﾛｺｼとｿﾙｶﾞﾑ） ○除草剤（10a） ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ 200cc～400cc（希釈水量70～100ﾘｯﾄﾙ） 播種直後に散布 （ｿﾙｶﾞﾑ、ｽｰﾀﾞﾝ、ﾛｰｽﾞ） ○深耕（20～30cm） ○多回耕（播種1週間前と当日2回） ○雑草が比較的少ない5月下～6月上旬の播種 ○厚播、鎮圧	糊熟期～黄熟期	（体系 1）トウモロコシ ○ ○ ×× ／ × × ○ ○ × エンバク・イタリアン混播
	ﾊﾟｲｵﾆｱ125日	ｻｲﾚｰｼﾞ	中生。桿長長く、乾物収量高。							
ｿﾙｶﾞﾑ	高糖分ソルゴー	ｻｲﾚｰｼﾞ	やや大型で、耐倒伏性高い。機械刈りが容易。	4月下旬～8月上旬	散播又は条播 40～75cm 2～3kg		5～6葉期 30kg 刈取後 40kg		出穂期～糊熟期 ｷﾝｸﾞｿﾙｺﾞｰはｽｰﾀﾞﾝｸﾞﾗｽと同様	（体系 2）ソルガム（またはローズまたはギニア） ○ ○ × × ／ × × イタリアン
	ｶﾈｺﾊｲﾌﾞﾘｯﾄｿﾙｺﾞｰ	ｻｲﾚｰｼﾞ	太茎、多葉型で、多収。耐病性強い。							
	ｷﾝｸﾞｿﾙｺﾞｰ	青刈り	初期生育旺盛。草丈高く、多葉、再生力、分げつ多。							
ｽｰﾀﾞﾝｸﾞﾗｽ	ﾍｲｽｰﾀﾞﾝ	乾草 青刈り	極細茎、分げつ多、再生力旺盛。多回刈りに適。	4月下旬～8月上旬	散播 6～8kg		刈取後 40kg		出穂前 草丈1.5m～出穂始め	
	HIRO-1	乾草 ｻｲﾚｰｼﾞ	収量安定、耐倒伏性優れる。							
	ﾍﾞｰﾙｽｰﾀﾞﾝ	乾草 ｻｲﾚｰｼﾞ	病害少なく、多収。							
ﾛｰｽﾞｸﾞﾗｽ	ｶﾀﾝﾎﾞﾗ	乾草	中生。茎が細く乾草向き。	4月下～6月中旬	散播 1.5～2kg	飼料作物838号がない場合は以下の代替でも可 BB48 60kg 苦土石灰 100kg ようりん 40kg（重焼燐 23kg） 堆肥 2t/10a	刈取後 40kg	掃除刈りを播種後40日頃	伸長期 草丈1m（刈高10cm以上）	（体系 3）イタリアン ／ × × ／ ○ 高糖分ソルゴー × ／ ○
ｷﾞﾆｱｸﾞﾗｽ	ﾅﾂｶｾﾞ	乾草	出穂遅く太茎、葉幅広く多収。	4月下～6月中旬	散播 1～1.5kg		刈取後 40kg			
ヒエ類	青葉ミレット	青刈り 乾草	耐湿性高く、多収。転作田向き。	5月上～7月下旬	散播 2～3kg		―		出穂期	
イタリアンライグラス	ﾐﾅﾐｱｵﾊﾞ	乾草 青刈り	極早生。冠さび病に強い。水田裏作に適する。	9月上旬～11月下旬	散播 3～4kg		刈取後 40kg	―	出穂期	（体系 4）青葉ミレット ○ ×× ／ × × ○ ○ × エンバク・イタリアン混播
	ﾀﾁﾜｾ	乾草 青刈り	早生。直立型で倒伏に強い。							
	ﾀﾁﾑｼｬ	乾草 青刈り	中生。直立型で倒伏に強く、多収。							
	ｼﾞｬｲｱﾝﾄ	青刈り 乾草 放牧	中晩生。多収で多回刈り向き。							
エンバク	ｽｰﾊﾟｰﾊﾔﾃ「隼」	ｻｲﾚｰｼﾞ 青刈り	極早生。ｲﾀﾘｱﾝとの混播に適 9月中旬までの播種（混播）では、年内刈取可能。多収。	9月上旬～11月下旬	散播 8～10kg（ｲﾀﾘｱﾝと混播時は6kg）		刈取後 30kg	酸性に弱いので必要に応じ苦土石灰増施	乳熟期～糊熟期	（体系 5）イタリアンライグラス（ジャイアント） × × ／ ○ ×
	ﾍｲｵｰﾂ	青刈り 乾草	早生。1番草、2番草ともに多収。							
	ﾆｭｰｵｰﾙﾏｲﾃｨｰ	青刈り 乾草	耐倒伏性、耐病性ともに高く、多収。							
ﾊﾞﾋｱｸﾞﾗｽ（多年草）	ﾅﾝｵｳ ペンサコラ	放牧 青刈り 乾草	4倍体で葉幅広い。採食性良好。 春の萌芽は遅いが、乾物収量高い。	4月下旬～8月下旬	散播 3kg	飼料作物 838号 100kg/10a（土壌分析結果により燐酸資材を追加） 堆肥 2t/10a	刈取後 30kg	草丈10cm程度で掃除刈り	（採草）草丈50cmまでに （放牧時）草丈30cm～40cm程度	バヒアは1年目の収量が少ないが、2年目以降は裸地部に追播しながら多年草として利用。 （1年目の雑草が多くなりやすいため、特に掃除刈りを行う） （秋まきの場合は、翌年以降利用）
ﾈﾋﾟｱｸﾞﾗｽ（多年草）	矮性晩生	青刈り （放牧可） サイレージ	永年性で、嗜好性よく、多収。 苗での移植による。	5月下旬～8月梅雨時期が適する	苗移植 畦間1m 株間0.5m		刈取後 30kg	管理機などで畦間を耕うん	草丈120cm～150cmで刈取	ﾈﾋﾟｱｸﾞﾗｽは種子が出来ない（不稔）ため株を移植することで増殖させる。 移植1年目は株の定着促進のため適期収穫に努める。2年目以降は5月～10月下旬で3回収穫が可能。

平成22年12月　五島地域農業振興協議会畜産部会