

平成20年産 中晩柑栽培こよみ(甘夏柑)

五島地域農業振興協議会

月	旬	主要管理	対象病虫害	薬剤と濃度	注意事項																																																
1																																																					
2	下	整枝、剪定、誘引 春肥の施用																																																			
3	上				* 冬期にマシン油無散布園ではマシン油97%60倍を散布																																																
	中		かいよう病 (発芽前)	コサイドDF1000倍 +クレフノン200倍	・マシン油乳剤とコサイドDFは2週間以上散布間隔をあける ・発芽前に散布する。 ・樹勢低下園では散布しない。																																																
4	下		かいよう病	コサイドDF2000倍 +クレフノン200倍																																																	
5	上 中		スリップス シキスイ ハナムグリ	モスピラン水溶剤 4000倍 または スミチオン乳剤 1000倍	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">肥培管理</td> </tr> <tr> <td>1) 施肥量</td> <td colspan="2">kg / 10a</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3t</td> <td>4t</td> </tr> <tr> <td>春肥</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2月下旬～3月上旬</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>夏肥</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5月中旬～下旬</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>初秋肥</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8月下旬～9月上旬</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>晩秋肥</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11月上旬</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">肥料: 五島甘夏柑用(12-8-8)</td> </tr> <tr> <td>2) 土づくり</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2月上旬中に堆肥を2t / 10a以上施用する</td> </tr> <tr> <td colspan="3">セルカを100kg / 10a施用する</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ようりんを60kg / 10a施用する</td> </tr> </table>	肥培管理			1) 施肥量	kg / 10a			3t	4t	春肥			2月下旬～3月上旬	80	80	夏肥			5月中旬～下旬	80	80	初秋肥			8月下旬～9月上旬	50	60	晩秋肥			11月上旬	50	60	肥料: 五島甘夏柑用(12-8-8)			2) 土づくり			2月上旬中に堆肥を2t / 10a以上施用する			セルカを100kg / 10a施用する			ようりんを60kg / 10a施用する		
	肥培管理																																																				
	1) 施肥量	kg / 10a																																																			
	3t	4t																																																			
春肥																																																					
2月下旬～3月上旬	80	80																																																			
夏肥																																																					
5月中旬～下旬	80	80																																																			
初秋肥																																																					
8月下旬～9月上旬	50	60																																																			
晩秋肥																																																					
11月上旬	50	60																																																			
肥料: 五島甘夏柑用(12-8-8)																																																					
2) 土づくり																																																					
2月上旬中に堆肥を2t / 10a以上施用する																																																					
セルカを100kg / 10a施用する																																																					
ようりんを60kg / 10a施用する																																																					
中	開花期 夏肥	灰色かび病 そうか病 黒点病	フロンサイドSC 2000倍 エムダイファー水和剤 800倍																																																		
下																																																					
6	上		かいよう病 黒点病 スリップス	コサイドDF 2000倍 +クレフノン 200倍 ジマンダイセン水和剤 600倍																																																	
	下	荒摘果 (6月下旬～7月)	黒点病	エムダイファー水和剤 600倍																																																	
7	上		黒点病 スリップス サビダニ	ジマンダイセン水和剤 600倍	・ロウムシ類、カキリムシ発生園では、スプラサイド乳剤1000倍を散布する。																																																
	中 下		かいよう病	コサイドDF2000倍 +クレフノン200倍																																																	
8	上 中	仕上げ摘果	小黒点病 スリップス	ジマンダイセン水和剤 600倍	・摘果は最終幼果比80～100枚に1果にする。																																																
	下	初秋肥の施用	ハダニ	サンマイト水和剤 2000倍 またはバロックフロアブル2000倍																																																	
9																																																					
10	上 下	樹上選果																																																			
11	上	晩秋肥の施用																																																			
12			貯蔵病害	トップジンM水和剤 2000倍	・収穫14日前までに散布する。																																																
	収穫	(収穫後) ハダニ カイガラムシ類		マシン油乳剤(97%) 60倍	・マシン油乳剤は小枝から幹まで十分量を散布する。																																																

農業使用基準は平成20年1月21日時点のものです。使用前にラベルをよく読み安全基準を守りましょう。